

ANKIETA (narzędzie diagnostyczne)

UWAGA!

Ten lek, Tadacontrol, zawierający tadalafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek może być dla Ciebie, jeśli jesteś dorosłym (> 18 r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, przejdź do pytań poniżej.

ZAZNACZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA PONIŻEJ - SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ BEZPIECZNIE PRZYJĄĆ LEK	TAK lub NIE WIEM	NIE
a Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej)? Jeżeli stosujesz poniższe leki, przyjęcie leku TADALOVE może zagrażać Twojemu życiu!		
1. nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. izosorbid (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Mono Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. molsidominę (np. Molsidomina WZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Czy występują u Ciebie następujące objawy związane z chorobami serca/krażenia?		
1. w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawiał się ból za mostkiem w klatce piersiowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. zwykła, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca (arytmie), które NIE jest leczone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg), które NIE jest leczone 8 w ostatnich 6 miesiącach przeżyłeś zawał serca lub udar mózgu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?		
1. masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. stosujesz leki z powodu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach), takie jak riociguat (np. Adempas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra (tzw. "porażenie oka")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. rozpoznano u Ciebie ciężkie choroby wątroby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Czy występują u Ciebie:		
1. dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. białaczka (choroba nowotworowa krwi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. szpiczak mnogiej (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Czy stosujesz leki używane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym?		
1. doksazosynę (np. Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. terazosynę (np. Hytrin, Kornam, Setegis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. alfuzosynę (np. Alfabax, AlfuLEK, Alfurion, Afluzostad, Alugen, Dalfaz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. silodosynę (np. Silodxy, Urorec)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. tamsulosynę (np. Adamat, Apo-Tamis, Bazetham, Duodart, Fokusin, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostamin, Ranlosin, Suprostit, Symlosin, Tamiron, TamisPRAS, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Tanyz, Uprox, Urostad, Vesomni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. dutasteryd (np. Adadut, Avodart, Davoster, Dufast, Dutasteride, Dutasteryd, Dutrys, Findarts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. finasteryd (np. Adaster, Androster, Antiprost, Apo-Fina, FinaGen, Finahit, Finamef, Finaran, Finaride, Finaster, Finasterid Stada, Finasteride, Finasteridum Bluefish, Finiprost, Finpros, Finxta, Hyplafin, Penester, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f Czy jesteś obecnie w trakcie leczenia lekami przeciwbakteryjnymi (antybiotykami)?		
1. erytromycyną (np. Davercin, Erythromycinum TZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. klarytromycyną (np. Apidar, Fromilid, Klaxab, Klabion, Klabolic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g Czy stosujesz poniższe leki przeciwgrzybicze?		
1. itraconazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrokast, Itromyx, Orungal, Trioxal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, Fluconazole, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycon, Fluxazol, Locaring, Mycomax, Mycosyst)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ketokonazol (np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA) - obecnie stosowany w leczeniu zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ODCZYTAJ WYNIK I ZAZNACZ DECYZJĘ PONIŻEJ W KRATCE:

NIE MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEKU TADACONTROL BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM

LUB

MOGĘ ZASTOSOWAĆ LEK TADACONTROL

Przynajmniej
1xTAK
lub NIE WIEM

Wszystkie NIE

Przed zastosowaniem leku przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek TADACONTROL, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą.

PAMIĘTAJ! Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzrodu. Występowanie zaburzeń wzrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt, zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz TADACONTROL.